

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten**

Wirkstoff: Sumatriptansuccinat

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- **Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.**

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

- 1. Was sind Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten und wofür werden sie eingenommen?**
- 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten beachten?**
- 3. Wie sind Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten einzunehmen?**
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
- 5. Wie sind Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten aufzubewahren?**
- 6. Weitere Informationen**

#### **1. WAS SIND SUMATRIPTAN-KRANIT® 50 MG FILMTABLETTEN UND WOFÜR WERDEN SIE EINGENOMMEN?**

Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten werden oral eingenommen und enthalten Sumatriptan, das zur Arzneimittelgruppe der so genannten Triptane gehört (*ebenfalls bekannt als 5-HT<sub>1</sub>-Rezeptor-Agonisten*).

**Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten werden zur akuten Behandlung von Migräneanfällen mit und ohne Aura eingenommen.**

Migränesymptome können durch die vorübergehende Erweiterung der Blutgefäße im Kopf verursacht werden. Man nimmt an, dass Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten diese Erweiterung der Blutgefäße vermindern. Das hilft dabei, dass die Kopfschmerzen vergehen und andere Symptome des Migräneanfalls gelindert werden, wie z. B. Übelkeit oder Erbrechen sowie Licht- und Lärmempfindlichkeit.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON SUMATRIPTAN-KRANIT® 50 MG FILMTABLETTEN BEACHTEN?

**Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden,**

- **wenn Sie überempfindlich** (allergisch) gegen Sumatriptan oder einen der sonstigen Bestandteile sind (siehe Abschnitt 6).
- **wenn Sie Probleme mit dem Herz haben** wie z. B. Verengung der Herzkranzgefäße (*ischämische Herzkrankheit*) oder Brustschmerzen (Angina pectoris), oder wenn Sie bereits einen Herzinfarkt hatten.
- **wenn Sie Durchblutungsstörungen in Ihren Beinen haben**, die krampfartige Schmerzen beim Gehen verursachen (periphere Gefäßerkrankung).
- **wenn Sie einen Schlaganfall hatten** oder vorübergehende Zustände von Minderdurchblutung im Gehirn (auch vorübergehende ischämische Attacke genannt).
- **wenn Sie hohen Bluthochdruck haben.** Sie können Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten einnehmen, wenn Ihr Blutdruck leicht erhöht und gut eingestellt ist.
- **wenn Sie eine schwere Lebererkrankung haben.**
- **zusammen mit anderen Migräne-Medikamenten**, einschließlich solcher, die Ergotamin enthalten, oder vergleichbarer Medikamente wie Methysergid oder einem anderen Triptan / 5-HT<sub>1</sub>-Rezeptor-Agonisten (Medikamente, die ebenfalls zur Behandlung von Migräne verwendet werden).
- **wenn Sie bestimmte Antidepressiva, so genannte MAOIs** (*Monoaminoxidase-Hemmer*), einnehmen oder bis vor zwei Wochen eingenommen haben.

Wenn eine dieser Gegenanzeigen auf Sie zutrifft:

**→ Informieren Sie Ihren Arzt und nehmen Sie Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten nicht ein.**

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten ist erforderlich**

Ihr Arzt benötigt bestimmte Informationen, bevor Sie Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten einnehmen:

**Wenn Sie bestimmte Risikofaktoren haben**

- **wenn Sie ein starker Raucher sind** oder **wenn Sie sich einer Nikotinersatztherapie unterziehen** und besonders
- **wenn Sie ein Mann über 40 Jahre sind** oder
- **wenn Sie eine Frau in oder nach den Wechseljahren (Menopause) sind.**

In sehr seltenen Fällen sind bei Patienten nach der Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten schwerwiegende Herzprobleme aufgetreten, ohne dass es vorher Anzeichen für eine Herzerkrankung gab.

Wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft, könnte das bedeuten, dass Sie ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Herzerkrankung haben, daher:

**→ Informieren Sie Ihren Arzt, damit Ihre Herzfunktion überprüft werden kann,** bevor Ihnen Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten verschrieben wird.

**Wenn Sie in der Vergangenheit unter Krampfanfällen (*epileptischen Anfällen*) litten** oder bei Ihnen Risikofaktoren vorliegen, die die Gefahr von Krampfanfällen erhöhen, zum Beispiel eine Kopfverletzung oder Alkoholabhängigkeit.

**Wenn Sie eine Leber- oder Nierenerkrankung haben.**

**→ Informieren Sie Ihren Arzt, damit er Sie genauer überwachen kann.**

**Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen so genannte Sulfonamid-Antibiotika sind**

Wenn dies der Fall ist, könnten Sie ebenfalls überempfindlich (allergisch) gegen Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten sein.

Falls Sie wissen, dass Sie überempfindlich gegen ein Antibiotikum sind, aber nicht wissen, ob es sich um ein Sulfonamid handelt:

**→ Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten einnehmen.**

**Wenn Sie Medikamente gegen Depressionen, so genannte SSRI**s (selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer) oder SNRIs (Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer), einnehmen.

**→ Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten einnehmen.** Siehe auch „Bei Einnahme von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten mit anderen Arzneimitteln“ weiter unten.

**Wenn Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten häufig einnehmen**

Eine zu häufige Einnahme von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten kann Ihre Kopfschmerzen verschlimmern.

**→ Informieren Sie Ihren Arzt, wenn dies auf Sie zutrifft.** Er wird Ihnen möglicherweise das Absetzen von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten empfehlen.

**Wenn Sie nach der Einnahme von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten Schmerzen oder Engegefühl im Brustkorb fühlen**

Diese Effekte können intensiv sein, gehen aber üblicherweise schnell vorüber. Falls sie nicht schnell vorübergehen oder falls sie schlimmer werden:

**→ Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.** In Abschnitt 4 dieser Packungsbeilage finden Sie mehr Informationen zu diesen möglichen Nebenwirkungen.

## **Bei Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten mit anderen Arzneimitteln**

**Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen** bzw. vor kurzem eingenommen haben. Dies schließt auch pflanzliche oder nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel mit ein.

Manche Arzneimittel dürfen nicht zusammen mit Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten eingenommen werden und andere können unerwünschte Wirkungen verursachen, wenn sie zusammen mit Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten eingenommen werden. **Sie müssen Ihren Arzt informieren, wenn Sie folgende Arzneimittel einnehmen:**

- **Ergotamin**, das ebenfalls zur **Migränebehandlung** eingesetzt wird, oder ähnliche Arzneimittel, wie z. B. Methysergid (siehe Abschnitt 2 unter „Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden“). Wenden Sie Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten nicht gleichzeitig mit diesen Arzneimitteln an. Beenden Sie die Einnahme dieser Arzneimittel mindestens 24 Stunden vor der Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten. Nehmen Sie nach der Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten mindestens innerhalb der nächsten 6 Stunden keine Arzneimittel, die Ergotamin oder mit Ergotamin verwandte Substanzen enthalten, ein.

- **Andere Triptane / 5-HT<sub>1</sub>-Rezeptor-Agonisten** (wie z. B. Naratriptan, Rizatriptan, Zolmitriptan), die auch zur Behandlung der **Migräne** eingenommen werden (siehe Abschnitt 2 unter „Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden“). Wenden Sie Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten nicht gleichzeitig mit diesen Arzneimitteln an. Beenden Sie die Einnahme dieser Arzneimittel mindestens 24 Stunden vor der Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten. Nehmen Sie nach der Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten mindestens innerhalb der nächsten 24 Stunden kein anderes Triptan / 5-HT<sub>1</sub>-Rezeptor-Agonisten ein.

- **SSRIs** (*selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer*) oder **SNRIs** (*Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer*) zur Behandlung von **Depressionen**. Die gleichzeitige Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten mit diesen Arzneimitteln kann ein so genanntes Serotonin-Syndrom verursachen (Symptome können Unruhe, Verwirrtheit, Schwitzen, Halluzinationen, gesteigerte Reflexe, Muskelkrämpfe, Zittern / Frösteln, erhöhten Herzschlag und Schütteln beinhalten). Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie auf diese Weise beeinträchtigt sind.

- **MAOIs** (*Monoaminoxidase-Hemmer*) zur Behandlung von **Depressionen**. Wenden Sie Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten nicht an, wenn Sie ein derartiges Arzneimittel innerhalb der letzten beiden Wochen eingenommen haben.

- **Johanniskraut** (*Hypericum perforatum*). Bei gemeinsamer Einnahme von Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten und pflanzlichen Zubereitungen, die Johanniskraut enthalten, können möglicherweise eher Nebenwirkungen auftreten.

## **Schwangerschaft und Stillzeit**

**Wenn Sie schwanger sind oder schwanger sein könnten**, informieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten einnehmen. Es gibt bisher nur begrenzte Informationen zur Sicherheit von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten bei schwangeren Frauen, auch wenn es bisher keinen Anhalt für ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko gibt. Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, ob Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten während der Schwangerschaft einnehmen sollten oder nicht.

**Stillen Sie Ihren Säugling bis 12 Stunden nach der Einnahme von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten nicht.** Wenn Sie während dieser Zeit Milch abpumpen, verwerfen Sie diese und geben Sie sie nicht Ihrem Säugling.

## **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Sowohl durch den Migräneanfall als auch durch die Einnahme von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten kann Müdigkeit hervorgerufen werden. **Wenn Sie hiervon betroffen sind, fahren Sie nicht Auto und bedienen Sie keine Maschinen.**

## **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### **3. WIE SIND SUMATRIPTAN-KRANIT<sup>®</sup> 50 MG FILMTABLETTEN EINZUNEHMEN?**

**Nehmen Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten erst dann ein, wenn der Migränekopfschmerz begonnen hat.**

**Nehmen Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten nicht ein, um einer Migräneattacke vorzubeugen.**

Nehmen Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

#### **Welche Menge sollten Sie einnehmen?**

**Die übliche Dosis für Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren** ist eine Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtablette. Einige Patienten können 100 mg Sumatriptan benötigen (entspricht zwei Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten). Bei Einnahme höherer Dosen als 100 mg Sumatriptan ist keine Wirkungsverbesserung zu erwarten. **Nehmen Sie nicht mehr als 300 mg Sumatriptan (entspricht sechs Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten) innerhalb von 24 Stunden ein.**

Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten werden nicht zur Einnahme bei Kindern unter 18 Jahren und bei Erwachsenen über 65 Jahren empfohlen.

### **Wann sollten Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten einnehmen?**

**Am besten wenden Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten an, sobald Sie bemerken, dass der Migränekopfschmerz beginnt.** Die Einnahme kann aber auch zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt während einer Migräneattacke erfolgen.

### **Wenn Ihre Symptome wiederkehren**

Wenn bereits abgeklungene Beschwerden wieder auftreten, können Sie weitere Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten einnehmen, aber **nehmen Sie nicht mehr als 300 mg Sumatriptan (entspricht sechs Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten) innerhalb von 24 Stunden ein.**

### **Wie sind Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten einzunehmen?**

Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten werden unzerkaut mit Wasser eingenommen.

### **Wenn die erste Filmtablette keine Wirkung zeigt**

**Wenden Sie keine zweite Filmtablette für dieselbe Migräneattacke an.**

Wenn Ihnen Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten keinerlei Linderung verschafft:

**→ Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.**

### **Wenn Sie mehr Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten eingenommen haben, als Sie sollten**

**Die Einnahme von zu viel Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten kann Sie krank machen.** Wenn Sie mehr als sechs Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten innerhalb von 24 Stunden eingenommen haben:

**→ Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.**

**Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Einige Symptome können durch die Migräne selbst verursacht sein.

### **Allergische Reaktionen: suchen Sie umgehend einen Arzt auf**

Die folgenden Nebenwirkungen sind aufgetreten, aber die genaue Häufigkeit ihres Auftretens ist nicht bekannt.

**Zeichen einer Allergie können sein: Hautausschlag, Nesselsucht (juckender Ausschlag); pfeifende Atemgeräusche; geschwollene Augenlider, Gesicht oder Lippen; Kreislaufzusammenbruch.**

Wenn Sie eines dieser Symptome kurz nach der Einnahme von Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten bemerken:

**→ Nehmen Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten nicht mehr ein. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.**

### **Häufige Nebenwirkungen**

(betreffen bis zu **1 von 10** Behandelten)

Schmerzen, Schweregefühl, Druckgefühl, Enge oder Schmerzen in der Brust, im Hals oder in anderen Körperteilen, ungewöhnliche Empfindungen oder Sinneseindrücke wie Taubheitsgefühl, Kribbeln, Hitze- oder Kältegefühl. Diese Symptome können intensiv sein, gehen aber im Allgemeinen schnell vorüber.

**Wenn diese Symptome andauern oder schlimmer werden** (besonders die Brustschmerzen):

**→ Suchen Sie umgehend einen Arzt auf.** Bei sehr wenigen Patienten können diese Symptome durch einen Herzinfarkt verursacht sein.

Weitere häufige Nebenwirkungen

- Übelkeit oder Erbrechen, dies kann jedoch durch die Migräneattacke selbst ausgelöst werden.
- Müdigkeit oder Benommenheit.
- Schwindel, sich schwach fühlen, Hitzewallungen / Gesichtsrötung.
- Vorübergehender Blutdruckanstieg.
- Kurzatmigkeit.
- Schmerzende Muskeln.

### **Sehr seltene Nebenwirkungen**

(betreffen bis zu **1 von 10.000** Behandelten)

Veränderungen der Leberfunktion. Wenn bei Ihnen die Leberwerte im Blut überprüft werden, informieren Sie Ihren Arzt oder die Arzthelferin, dass Sie Sumatriptan-Kranit<sup>®</sup> 50 mg Filmtabletten einnehmen.

**Einige Patienten können die folgenden Nebenwirkungen haben, aber es ist nicht bekannt, in welcher Häufigkeit sie auftreten**

- Krampfanfälle (epileptische Anfälle), Zittern, Muskelkrämpfe, Steifheit des Nackens.
- Sehstörungen wie Augenflimmern, Verminderung der Sehschärfe, Doppelsehen, Sehverlust und in einigen Fällen auch bleibender Sehverlust (diese Symptome können auch durch die Migräneattacke selbst ausgelöst werden).

- Herzbeschwerden, bei denen der Herzschlag sich beschleunigen, verlangsamen oder den Rhythmus ändern kann, Schmerzen in der Brust (Angina pectoris) oder Herzinfarkt.
- Blässe, blau getönte Haut und/oder Schmerzen in den Fingern, Zehen, Ohren, in der Nase oder im Kiefer als Reaktion auf Kälte oder Stress (*Raynaud-Syndrom*).
- Ohnmachtsgefühl (der Blutdruck kann absinken).
- Schmerzen im linken Unterbauch und blutiger Durchfall (*ischämische Kolitis*).
- Durchfall
- Gelenkschmerzen
- Angst / Unruhe
- Übermäßiges Schwitzen.

**Wenn sich eine der Nebenwirkungen verschlimmert oder wenn Sie eine Nebenwirkung bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt ist, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.**

## **5. WIE SIND SUMATRIPTAN-KRANIT® 50 MG FILMTABLETTEN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Verwenden Sie Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten nicht mehr nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Arzneimittel dürfen nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie Arzneimittel zu entsorgen sind, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten enthalten**

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist: Sumatriptansuccinat.

1 Filmtablette enthält 70 mg Sumatriptansuccinat entsprechend 50 mg Sumatriptan.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Hypromellose, Triacetin, Macrogol 8000, Polydextrose, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H<sub>2</sub>O (E 172).

### **Wie Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten aussehen und Inhalt der Packung**

Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten sind rosafarbene, runde Filmtabletten, die auf einer Seite mit der Prägung „G“ und auf der anderen Seite mit der Prägung „SU50“ versehen sind.

Durchmesser ca. 9,5 mm.

Sumatriptan-Kranit® 50 mg Filmtabletten sind in Packungen mit 6 Filmtabletten (N2) erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstr. 2  
53783 Eitorf  
Telefon: 02243 / 87-0  
Telefax: 02243 / 87-175  
E-Mail: [Info@krewel-meuselbach.de](mailto:Info@krewel-meuselbach.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im August 2010.**