

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gargarisma Halstabletten

Was ist in Gargarisma Halstabletten enthalten?

1 Tablette enthält 9 mg Aluminiumkaliumsulfat (Alaun) 12 H₂O.

Sonstige Bestandteile:

Sorbitol, Pfefferminzaroma, Magnesiumstearat.

Wann werden Gargarisma Halstabletten angewendet?

Die Lutschtabletten werden bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut angewendet.

Alaun hat eine zusammenziehende und verfestigende Wirkung auf Eiweißstoffe und bewirkt eine Abstoßung von schädlichen Stoffen auf der Schleimhaut. Krankheitserreger können sich dadurch schlechter auf der Schleimhaut vermehren, und die Wundheilung wird gefördert.

Wann dürfen Gargarisma Halstabletten nicht angewendet werden?

Gargarisma Halstabletten dürfen nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe angewendet werden.

Bei Fructoseunverträglichkeit, Patienten mit Morbus Alzheimer oder Parkinsonsyndrom sowie bei dialysepflichtigen Personen soll die Behandlung nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Wann ist bei der Anwendung von Gargarisma Halstabletten Vorsicht geboten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Bei Kindern wird die Anwendung von Lutschtabletten erst ab 4 Jahren empfohlen, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.

Das enthaltene Sorbitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Dürfen Gargarisma Halstabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Daher sollte die Anwendung von Gargarisma Halstabletten in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Wie werden Gargarisma Halstabletten angewendet?

Bis zu 8-mal täglich 1 Tablette lutschen.

Hinweis für Diabetiker:

1 Tablette enthält 1,46 g Sorbitol, entspr. 0,13 BE.

Wie lange dürfen Sie Gargarisma Halstabletten anwenden?

Falls die Beschwerden nach 3-tägiger Anwendung nicht weitestgehend abgeklungen sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Welche Hinweise zur Haltbarkeit und Lagerung sind zu beachten?

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel und dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Die Lutschtabletten sind trocken und nicht über 25 °C zu lagern.

In welchen Packungsgrößen sind Gargarisma Halstabletten erhältlich?

Packungen mit 20 Lutschtabletten.

Hersteller

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstr. 2, 53783 Eitorf
Telefon: 02243 / 87-0, Telefax: 02243 / 87-175

Stand der Information

März 2008

[CE-Kennzeichnung]

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!