

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

**Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad 9 g/100 ml**  
Badezusatz

Wirkstoff: Benzylnicotinat

*Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.*

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad beachten?
3. Wie ist Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. WAS IST PERNIONIN<sup>®</sup> THERMO-VOLLBAD UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad ist ein medizinisches Rheumabad mit durchblutungsfördernder Wirkung.

Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad wird angewendet zur unterstützenden Behandlung bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

#### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON PERNIONIN<sup>®</sup> THERMO-VOLLBAD BEACHTEN?**

**Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Benzylnicotinat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei schweren Herz-, Leber- und Nierenerkrankungen,

- bei entzündlichen Hauterkrankungen,
- bei offenen Wunden,
- bei arteriellen Gefäßverschlüssen an Gliedmaßen,
- bei schweren diabetischen Mikroangiopathien (einengende oder verlegende Veränderungen kleiner und kleinster Arterien bei Zuckerkrankheit),
- Schwangerschaft,
- Stillzeit.
- Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad ist nicht zur Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern geeignet.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad anwenden.

Bei größeren Hautverletzungen und akuten (plötzlich auftretenden) und unklaren Hauterkrankungen, schweren fieberhaften und ansteckenden Erkrankungen, Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche) und hohem Blutdruck soll Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad darf nicht unverdünnt angewendet werden. Badekonzentrat nicht direkt auf die Schleimhaut aufbringen. Nicht im Bereich der Augen verwenden. Sollten versehentlich Spuren von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad ins Gesicht gelangen, kann vorübergehend ein im Allgemeinen harmloses Brennen mit anschließender Hautrötung auftreten. Mehrfaches Abspülen mit klarem Wasser ist dann empfehlenswert.

### **Kinder und Jugendliche**

Eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen wird nicht empfohlen.

### **Anwendung von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad darf nicht angewendet werden während Schwangerschaft und Stillzeit (siehe Abschnitt 2. „Was sollten Sie vor der Anwendung von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad beachten?“).

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

### 3. WIE IST PERNIONIN<sup>®</sup> THERMO-VOLLBAD ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### **Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die empfohlene Dosis:**

Soweit nicht anders verordnet, soll Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad folgendermaßen angewendet werden:

##### *Anwendung bei Erwachsenen:*

Beim ersten Bad werden 10 ml Konzentrat (entsprechend 0,9 g Benzylnicotinat) auf ein normales Wannenbad (ca. 150 l) gegeben. Bei den folgenden Bädern kann die Menge je nach persönlicher Ansprechbarkeit auf 15 - 20 ml (entsprechend 1,35 – 1,8 g Benzylnicotinat) gesteigert werden. Bei Verwendung von Sitzbadewannen soll die halbe Dosierung verwendet werden. Das Bad soll etwa alle 2 - 3 Tage wiederholt werden. Hinweis: Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad liegt ein Messbecher bei.

##### *Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:*

Eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen wird nicht empfohlen.

#### **Art der Anwendung**

Zur Bereitung von Vollbädern.

Man bereitet in einer normalen Badewanne ein Warmbad (36 °C – 39 °C). Die Badedauer beträgt 10 - 30 Minuten. Bei der ersten Anwendung sollte die Badezeit nicht länger als 10 Minuten betragen und die Badetemperatur sorgfältig beachtet werden (möglichst nicht über 37 °C). Das Bad kann zu jeder Tageszeit genommen werden. Beim Baden kann beliebig Seife benutzt werden.

#### **Dauer der Anwendung**

Das Bad kann etwa alle 2 - 3 Tage wiederholt werden. Die Anwendung kann so lange erfolgen, wie Beschwerden bestehen oder so lange, wie es Ihnen Ihr Arzt empfiehlt. Bei Beschwerden, die länger als 3 Tage anhalten, sollte zur Abklärung ein Arzt aufgesucht werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad zu stark oder zu schwach ist.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad angewendet haben, als Sie sollten**

Bei versehentlicher Einnahme von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad können brennende Schmerzen und Rötung der Mund- und Rachenschleimhaut, Gesichtsrötung sowie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten.

Bei einer Überdosierung von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad tritt verstärkte Hautrötung und Brennen der Haut auf, die nach einiger Zeit wieder verschwinden. In einem solchen Falle soll die Haut mehrfach mit klarem Wasser abgespült werden.

Bei Anwendung von wesentlich zu großen Mengen oder versehentlicher Einnahme von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann entsprechend der Art und Schwere der Beschwerden über die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen entscheiden. Spezifische Gegenmittel sind nicht bekannt; auf keinen Fall sollte Erbrechen herbeigeführt werden, da beim Erbrechen die Gefahr besteht, dass Schaum in die Lunge gelangt.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad vergessen haben**

Wenn Sie einmal zu wenig Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad verwendet haben, fügen Sie nicht zusätzlich Konzentrat hinzu, sondern nehmen Sie bei der nächsten Anwendung die Menge, die in dieser Packungsbeilage beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde. Wenn Sie eine Anwendung vergessen haben, holen Sie sie sobald wie möglich nach. Fahren Sie dann mit der Anwendung fort, wie in dieser Packungsbeilage beschrieben oder von Ihrem Arzt verordnet.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad abbrechen**

Bei einer Unterbrechung oder vorzeitigen Beendigung der Behandlung können die Krankheitszeichen wieder auftreten oder sich verschlechtern.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Bei genauer Beachtung der Dosierungsanleitung werden im Allgemeinen keine Nebenwirkungen beobachtet. Individuelle Unverträglichkeitserscheinungen (wie z. B. Juckreiz, Kontaktekzem) können in einzelnen Fällen auftreten; ein Aussetzen der Bäder ist dann zu empfehlen.

Hinweis: Ein leichtes Brennen der Haut sowie Hautrötung sind Zeichen der Wirkung des Bades.

Benetzung der Schleimhäute mit unverdünntem Konzentrat verursacht brennende Schmerzen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. WIE IST PERNIONIN® THERMO-VOLLBAD AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

Pernionin® Thermo-Vollbad ist nach Anbruch 6 Monate haltbar.

## **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Pernionin® Thermo-Vollbad enthält**

Der Wirkstoff ist: Benzylnicotinat

100 ml (entsprechend 92,183 g) flüssiger Badezusatz enthalten 9 g Benzylnicotinat.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Fichtennadelöl, 2-Propanol, Dodecylpoly(oxyethylen)-2-hydrogensulfat, Natriumsalz, gereinigtes Wasser; Farbstoffe: Chinolingelb (E 104), Patentblau V (E 131).

### **Wie Pernionin® Thermo-Vollbad aussieht und Inhalt der Packung**

Pernionin® Thermo-Vollbad ist eine klare, dunkelgrüne Lösung.

Pernionin® Thermo-Vollbad ist in Packungen mit 100 ml Badezusatz und 500 ml Badezusatz erhältlich.

Der Packung ist jeweils ein Messbecher beigelegt (Kennzeichnung des Medizinproduktes: CE 0123).

## **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstr. 2  
53783 Eitorf  
Telefon: 02243 / 87-0  
Telefax: 02243 / 87-175  
E-Mail: Info@krewel-meuselbach.de

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2014.**

### **Weitere Hinweise**

*Hochwirksames Behandlungsverfahren mit wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkprinzipien*

Pernionin<sup>®</sup> Thermo-Vollbad enthält durchblutungsfördernde Stoffe, die über die Haut aufgenommen werden. Dadurch verbessert sich der Stoffwechsel im Gewebe: chronisch entzündetes Gewebe wird besser ernährt, und die bei Entzündungen gehäuft anfallenden schmerzerzeugenden Stoffwechselprodukte werden rascher abtransportiert. Die wohlige Wärme eines solchen Bades trägt ebenfalls zur Wirkung bei. Die Gelenke werden beweglicher und muskuläre Verkrampfungen gelöst. Der Schmerz lässt nach. Es ist auch eine gute Vorbereitung zur Krankengymnastik, denn nach einem Bad ist die Muskulatur gelockert und der Schmerz gedämpft. So fallen die Bewegungen leichter.